

6

Referências Bibliográficas

ANDRADE,L.H.S.G.; GORESTEIN,C. **Aspectos gerais das escalas de avaliação de ansiedade**. Revista Brasileira de Psiquiatria Clínica 25 (6), 1998

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Diagnstic and Statistical Manual: Mental Disorders**. 4th Edition – Text review. DSM-IV-TR Washington, DC, American Psychiatric Association, 2000

ALLGULANDER, C.et al. **Efficacy of sertraline in a 12-week trial for generalized anxiety disorder**. American Journal Psychiatry;161(9):1642-9, Sep 2004

ANASTASI, A. ; Urbina, S. **Testagem Psicológica**. Porto Alegre. Artmed, 2000

BECK, A.T. et al. **An Inventory for Measuring Clinical Anxiety**. Journal of Consulting and Clinical Psychology 56:893-897,1988.

BECK, A.T.; STEER, R.A.; GARBIN, M.G. **Psychometric Properties of the Beck Depression Inventory: Twenty-Five Years of Evaluation**. Clinical Psychology Review 8:77-100, 1988

BECK, A.T. et al. **An Inventory for Measuring Depression**. Clinical Psychology Review 8(1) 77-100,1988

BENTLER, M. P. **Departments of Psychology and statistics PsychometriKa** 1 (74), pp137 – 143, 2009

CASTILLO, S.C. **Propriedades Psicométricas e Estrutura Latente da Versão em Português do Questionário de Preocupação do Estado da Pensilvânia, 2007**. 121p. Dissertação de mestrado – Pontifícia Universidade Católica (PUC), Rio de Janeiro

COSTA MONTEIRO, E. **Biometrologia: Confiabilidade nas Biomedições e Repercussões Éticas**. Metrologia & Instrumentação V. 49, p. 6-12, 2007

CUNHA, J. A. **Manual da versão em português das escalas Beck**. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2001

_____ **Psicodiagnóstico**. Porto Alegre, Artmed, 2008.

CÚRI, M. **Análise de questionários com itens constrangedores**, 2006.113p. Dissertação de mestrado – Universidade de São Paulo (USP), São Paulo

CACIOPPO, J.T.et al. **The psychophysiology of emotion**. Em **M. Lewis e J. Haviland-Jones (org.)**. **Handbook of Emotions**, New York, The Guilford Press. (2000).

LEWIS, M.; HAVILAND-JONES, J. (org.). **Handbook of Emotions**. The Guilford Press. New York, 2000.

DEROGATIS, L.R.; LIPMAN, R.S.; COVI, I. **SCL-90: An Outpatient Psychiatric Rating Scale**. **Psychopharmacology Bulletin** 9:13-27,1973.

DAVIDSON, J et al. **Efficacy and tolerability of duloxetine in elderly patients with generalized anxiety disorder: a pooled analysis of four randomized, double-blind, placebo-controlled studies**. **Human Psychopharmacology** 23(6):519-26, Aug 2008

ERTHAL, T.C. **Manual de Psicometria**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.

FEIGHNER, J. P.; COHN, J. B. **Analysis of Individual Symptoms in Generalized Anxiety - A Pooled, Multistudy, Double-Blind Evaluation of Buspirone Neuropsychobiology** 21:124-130,1989

FROTA, N.M.; OHAYON,P. **Padrões e unidades de medida**, 1998

GORESTEIN, C.; ANDRADE, L. **Inventário de depressão de Beck: propriedades psicométricas da versão em português**. In: **Gorenstein C., Andrade, L. H. S. G., Zuardi A. W. Escalas de avaliação clínica em psiquiatria e psicofarmacologia**. São Paulo: Lemos-Editorial pp. 89-95 , 2000

GREEN, B.S e YANG, Y. **Commentary on Coeficient Alpha: A cautionary tale**. **PsychometriKa** 1 (74), pp 121 – 135, 2009

HAMILTON, M. **A rating scale for depression**. **Journal Neurology Neurosurgery Psychiatry** 23 pp 56-62, 1960

_____ **The Assessment of Anxiety States by Rating**. **British Journal of Medical Psychology** 32 pp50-55, 1959

HUGDAHL, K. **Psychophysiological aspects of phobic fears: an evaluative review**. **Neuropsychobiology** 20 pp194-204,1988

INTERNATIONAL VOCABULARY OF METROLOGY (VIM). **Basic and General Concepts and Associated Terms** , 3rd edition, JCGM 200:2008

INSTITUTO EUVALDO LODI. **Tecnologia industrial básica: trajetória, desafios e tendências no Brasil** / Ministério da Ciência e Tecnologia, Confederação Nacional da Indústria, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial,. Brasília: MCT; CNI; SENAI/DN; IEL/NC, 2005

INMETRO. Disponível em <<http://www.inmetro.gov.br>>

JÚNIOR, G.A.A.; SOUSA, R A. **Fundamentos de metrologia científica e industrial**. São Paulo: Manole, 2008

KANTOWITZ, B.H.; ROEDIGER, H. L .;ELMES, D. G. **Psicologia Experimental**. São Paulo:Thompson, 2006

KLINE, P.P. **An easy guide to factor analysis. A handbook of test construction**. London: Routledge, 1993.

LEVENSON, R. W. **The intrapersonal functions of emotion. Cognition and Emotion** 5(13), pp. 481-504, 1999

LANDEIRA,J. **Transtornos de ansiedade e o sistema motivacional de defesa: aspectos básicos e aplicados-** projeto CNPq, 1998

LENT, R. **Neurociência da mente e do comportamento**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008

_____. **Cem bilhões de neurônios**.São Paulo: Editora Atheneu, 2005

LORR, M.; McNAIR, D.M. **The Manual of the Profile of Mood States-POMS; San Diego: Educational and Industrial Testing Service**, 1984

SIJTSMAN, K. On the use, the misuse, and the very limited usefulness of Cronbach's alpha. **Psychometrika** 1 (74), pp107 – 120, 2009

SILVA, M. C. **Sistema para Avaliação da Conformidade de Eletrocardiógrafos**, 2008.175p.- Dissertação de mestrado – Pontifícia Universidade Católica (PUC), Rio de Janeiro

MONTGOMERY, A.S.; Åsberg, M. – **New Depression Scale Designed to be Sensitive to Change**. *British Journal of Psychiatry* 134, pp382-389,1979.

NARDI, A.E. **Questões atuais sobre depressão**.São Paulo: Lemos editorial, 2006

_____. **Some notes on a historical perspective of panic disorder**. *Jornal Brasileiro Psiquiatria* 55 (2), pp154-160, 2006.

_____. **Comentários do debatedor: escalas de avaliação de ansiedade**. *Revista Psiquiatria.Clínica* 25 (6) Edição Especial:331-333,1998.

NARDI , A.E.;VALENÇA, M.A. **Transtorno de pânico: diagnóstico e tratamento**.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005

NORONHA et al. **Teste dos Relógios e R-1 – Forma B: Evidências de validade Ana Paula Porto Noronha, Acácia Aparecida Angeli dos Santos, Fermio Fernandes Sisto**PSICO, Porto Alegre, PUCRS, v. 36, n. 3, pp. 243-249, set./dez. 2005

NUNNALLY, J.; BERNSTEIN, I. **Psychometric theory**, New York: McGraw-Hill, 1994.

Organização Mundial da Saúde. **Classificação de transtornos mentais e de comportamento da CID-10: descrições clínicas e diretrizes diagnósticas.**

Porto Alegre: Editora Artes Médicas; 1993.

OVERALL, J.E.;GORHAN, D.R. – **The Brief Psychiatry Rating Scale-Psychological Reports** 10 pp 799-812,1962.

PASQUALI, L. **Psicometria: teoria dos testes na psicologia e na educação.** Petrópolis, RJ: Vozes, 2003

SCHULTZ, D.P.; SCHULTZ . **História da Psicologia Moderna.** São Paulo: Thompson, 2006

SPIELBERGGER, C.D.; GORSUCH, R.L.; LUSHENE, R.E. **Manual for the Strait-Trait Anxiety Inventory.** Palo Alto, CA, Consulting Psychologists Press., 1970

SNAITH, R.P.et al. **The Clinical Anxiety Scale: An Instrument Derived from the Hamilton Anxiety Rating Scale.** British Journal of Psychiatry 141 pp 518-523,1982.

TABACHNICK, B. G.; FIDELL, L. S. **Using multivariate statistics.** Needham Heights, MA, Allyn and Bacon eds., [S. l.: s. n.], 2001.

TYRER, P.; OWEN, R.T.; CICCHETTI, D. – **The Brief Anxiety Scale.** Journal of Neurology Neurosurgery Psychiatry 47 pp 970-975,1984.

Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM). Rio de Janeiro:Inmetro, 2007.

International Vocabulary of Metrology (VIM):Basic and general concepts and associated terms. BIPM, 2008

VERGARA, S. C. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração.** São Paulo: Guanabara Koogan, 2000

YERKES, R.M.; DODSON, J. D. **The relation of strength of stimulus to rapidity of habit-formation.** Journal of Comparative Neurology and Psychology, 18, pp. 459-482, 1908.

ZIGMOND, A.; SNAITH, R.P. – **The Hospital Anxiety and Depression Scale- Acta Psychiatrica Scandinavica** 67 pp 361-370,1983.

ZUNG, W. – **A Rating Instrument for Anxiety Disorders-Psychosomatics** 12 pp 371-379,1971.

_____ **A Self-Rating Depression Scale.** Archives of General Psychiatry 12 pp 63-70,1965.

Apêndice 1

Tabela 26:ASPI qualitativa restrita para avaliação do grau de contribuição de cada item do inventário Beck para identificação do nível de acometimento do transtorno de ansiedade (BAI), com o inventário aplicado somente a pacientes com diagnóstico de transtorno de ansiedade.

Inventário BAI	Nível de acometimento do constructo (BAI)	P0	P1	P2	P3	ASPI qualitativa restrita
I₁	Minimo	7	2	0	0	Contribui
	Leve	9	5	1	0	Contribui
	Moderado	4	6	3	0	Não contribui
	Grave	3	2	4	0	Não contribui
I₂	Minimo	8	1	0	0	Contribui
	Leve	4	5	5	1	Não contribui
	Moderado	5	4	4	0	Não contribui
	Grave	2	1	4	2	Não contribui
I₃	Minimo	8	1	0	0	Contribuiu
	Leve	12	1	2	0	Contribui
	Moderado	10	1	2	0	Não contribui
	Grave	2	1	5	1	Não contribui
I₄	Minimo	6	2	1	0	Contribui
	Leve	2	6	6	1	Não contribui
	Moderado	1	3	7	2	Contribui
	Grave	0	0	5	4	Contribui
I₅	Minimo	6	3	0	0	Contribui
	Leve	4	5	5	1	Não contribui
	Moderado	0	5	3	5	Não contribui
	Grave	0	1	5	3	Contribui pouco
I₆	Minimo	7	1	1	0	Contribui
	Leve	7	8	0	0	Contribui
	Moderado	5	4	4	0	Contribui pouco
	Grave	0	2	3	4	Não contribui
I₇	Minimo	7	1	1	0	Contribui

	Leve	8	3	3	1	Contribui pouco
	Moderado	3	2	7	1	Não contribui
	Grave	0	0	7	2	Contribui
I₈	Minimo	8	1	0	0	Contribui
	Leve	9	6	0	0	Contribui
	Moderado	4	3	6	0	Contribui pouco
	Grave	0	4	2	3	Não contribui
I₉	Minimo	8	1	0	0	Contribui
	Leve	11	3	1	0	Contribui
	Moderado	8	1	3	1	Não contribui
	Grave	1	2	3	3	Não contribui
I₁₀	Minimo	3	4	2	0	Não contribui
	Leve	0	10	3	2	Contribui
	Moderado	0	4	3	6	Não contribui
	Grave	0	0	5	4	Não contribui
I₁₁	Minimo	8	1	0	0	Contribui
	Leve	12	1	1	1	Contribui
	Moderado	3	3	5	2	Não contribui
	Grave	1	3	2	3	Não contribui
I₁₂	Minimo	8	1	0	0	Contribui
	Leve	8	4	3	0	Contribui pouco
	Moderado	5	5	2	1	Não contribui
	Grave	0	5	1	2	Não contribui
I₁₃	Minimo	8	1	0	0	Contribui
	Leve	10	2	3	0	Contribui
	Moderado	4	5	3	1	Não contribui
	Grave	0	3	4	2	Não contribui
I₁₄	Minimo	7	2	0	0	Contribuiu
	Leve	7	4	3	1	Não contribui
	Moderado	2	5	4	2	Não contribui
	Grave	0	5	1	2	Não contribui
I₁₅	Minimo	7	1	1	0	Contribui
	Leve	7	5	2	1	Não contribui
	Moderado	6	3	4	0	Não contribui
	Grave	0	4	4	1	Não contribui
I₁₆	Minimo	8	1	0	1	Contribui
	Leve	13	2	0	0	Contribui
	Moderado	6	3	1	3	Contribui pouco
	Grave	3	2	3	2	Não contribui
I₁₇	Minimo	6	3	0	0	Contribui
	Leve	8	5	2	0	Contribui
	Moderado	3	6	4	0	Contribui pouco
	Grave	2	1	2	4	Não contribui
I₁₈	Minimo	9	0	0	0	Contribui
	Leve	6	6	3	0	Contribui pouco
	Moderado	5	3	5	0	Não contribui
	Grave	1	1	5	2	Não contribui

I₁₉	Minimo	9	0	0	0	Contribui
	Leve	9	4	2	0	Contribui pouco
	Moderado	5	4	3	1	Não contribui
	Grave	2	2	4	1	Não contribui
I₂₀	Minimo	9	0	0	0	Contribui
	Leve	11	1	3	0	Contribui
	Moderado	6	2	5	0	Não contribui
	Grave	1	1	6	1	Não contribui
I₂₁	Minimo	7	2	0	0	Contribui
	Leve	6	4	3	2	Contribui pouco
	Moderado	6	4	3	0	Contribui pouco
	Grave	3	1	3	2	Não contribui

Tabela 27: ASPI qualitativa restrita para avaliação do grau de contribuição de cada item do inventário Beck para identificação do nível de acometimento do transtorno de humor (BDI), com o inventário aplicado somente a pacientes com diagnóstico de transtorno de humor

Inventário BDI	Nível de acometimento do constructo (BDI)	P0	P1	P2	P3	ASPI qualitativa restrita
I₁	Minimo	7	5	0	0	Contribui pouco
	Leve	4	6	2	0	Contribui
	Moderado	2	6	4	6	Não contribui
	Grave	0	1	4	7	Contribui
I₂	Minimo	11	1	0	0	Contribui
	Leve	5	6	1	0	Contribui
	Moderado	6	3	3	6	Não contribuiu
	Grave	0	3	1	8	Contribui pouco
I₃	Minimo	12	0	0	0	Contribui
	Leve	7	3	2	0	Contribui
	Moderado	8	2	7	1	Não contribui
	Grave	0	3	4	5	Não contribui
I₄	Minimo	5	6	0	1	Contribui pouco
	Leve	3	7	0	2	Contribui
	Moderado	1	10	3	4	Contribui
	Grave	0	1	2	9	Contribui
I₅	Minimo	11	1	0	0	Contribui
	Leve	10	2	0	0	Contribui
	Moderado	6	2	4	6	Não contribui
	Grave	3	1	1	7	Contribui
I₆	Minimo	12	0	0	0	Contribui
	Leve	8	3	0	1	Contribui
	Moderado	7	3	2	6	Não contribui
	Grave	3	1	2	6	Contribui pouco

I₇	Minimo	8	4	0	0	Contribui pouco
	Leve	8	4	0	0	Contribui
	Moderado	8	9	1	0	Não contribui
	Grave	4	4	2	2	Não contribui
I₈	Minimo	6	4	2	0	Contribui pouco
	Leve	3	5	3	1	Não contribui
	Moderado	3	11	4	0	Contribui pouco
	Grave	3	3	11	5	Contribui
I₉	Minimo	12	0	0	0	Contribui
	Leve	9	1	1	1	Contribui
	Moderado	11	7	0	0	Não contribui
	Grave	4	1	0	7	Não contribui
I₁₀	Minimo	11	0	0	1	Contribui
	Leve	5	2	0	5	Não contribui
	Moderado	2	8	4	4	Não contribui
	Grave	1	0	5	6	Contribui
I₁₁	Minimo	6	4	0	2	Contribui pouco
	Leve	4	5	2	1	Contribui pouco
	Moderado	2	8	3	5	Contribui pouco
	Grave	0	1	9	2	Contribui
I₁₂	Minimo	9	2	1	0	Contribui
	Leve	4	5	1	2	Contribui
	Moderado	3	5	7	3	Contribui pouco
	Grave	0	1	4	7	Contribui
I₁₃	Minimo	6	3	3	0	Contribui pouco
	Leve	5	2	4	1	Não contribui
	Moderado	2	6	7	3	Contribui
	Grave	0	0	5	7	Contribui
I₁₄	Minimo	10	2	0	0	Contribui
	Leve	7	2	2	1	Contribui
	Moderado	4	5	6	3	Não contribui
	Grave	2	0	6	4	Contribui
I₁₅	Minimo	6	5	1	0	Contribui pouco
	Leve	1	5	6	0	Não contribui
	Moderado	1	1	13	3	Contribui
	Grave	0	1	7	4	Contribui
I₁₆	Minimo	5	5	1	1	Não contribui
	Leve	4	4	0	4	Não contribui
	Moderado	1	6	3	8	Não contribui
	Grave	0	2	2	8	Contribui pouco
I₁₇	Minimo	9	3	0	0	Contribui
	Leve	3	6	3	0	Não contribui
	Moderado	3	5	7	3	Contribui pouco
	Grave	1	2	1	8	Contribui
I₁₈	Minimo	11	1	0	0	Contribui
	Leve	9	3	0	0	Contribui
	Moderado	10	2	4	2	Não contribui
	Grave	2	2	5	3	Não contribui

I₁₉	Mínimo	11	1	0	0	Contribui
	Leve	12	0	0	0	Contribui
	Moderado	15	3	0	0	Não contribui
	Grave	7	4	1	0	Não contribui
I₂₀	Mínimo	7	5	0	0	Contribui pouco
	Leve	7	3	2	0	Contribui
	Moderado	6	6	2	4	Não contribui
	Grave	3	1	2	6	Contribui pouco
I₂₁	Mínimo	7	4	0	1	Contribui pouco
	Leve	2	5	2	3	Não contribui
	Moderado	2	6	6	4	Não contribui
	Grave	1	0	2	9	Contribui

Tabela 28: ASPI qualitativa restrita para avaliação do grau de contribuição de cada item do inventário Hamilton para identificação do nível de acometimento do transtorno de ansiedade (HAM-A), com o inventário aplicado somente a pacientes com diagnóstico de transtorno de ansiedade

Inventário HAM-A	Nível de acometimento do constructo (HAM-A)	P0	P1	P2	P3	P4	ASPI qualitativa restrita
I₁	Mínimo	5	3	4	1	0	Não contribui
	Leve	0	2	2	2	0	Não contribui
	Moderado	2	0	6	1	1	Contribui
	Grave	1	1	1	10	5	Contribui
I₂	Mínimo	7	1	4	1	0	Contribui
	Leve	1	1	1	3	0	Não contribui
	Moderado	1	0	6	3	0	Contribui
	Grave	0	1	3	11	3	Contribui
I₃	Mínimo	9	1	3	0	0	Contribui
	Leve	3	3	0	0	0	Contribui
	Moderado	4	1	2	2	1	Não Contribui
	Grave	4	2	2	5	5	Não contribui
I₄	Mínimo	8	1	2	1	1	Contribui
	Leve	1	1	1	1	2	Não contribui
	Moderado	1	0	4	1	4	Não contribui
	Grave	1	0	0	9	8	Contribui
I₅	Mínimo	5	2	3	2	1	Não contribui
	Leve	0	2	2	1	1	Não contribui
	Moderado	2	1	3	3	1	Não contribui
	Grave	0	1	3	8	6	Contribui
I₆	Mínimo	5	3	5	0	0	Contribui pouco
	Leve	1	0	3	2	0	Não contribui

	Moderado	0	2	5	0	3	Contribui pouco
	Grave	0	1	2	9	6	Contribui
I₇	Mínimo	11	1	0	1	0	Contribui
	Leve	4	1	0	0	1	Contribui
	Moderado	1	1	4	3	1	Contribui pouco
	Grave	3	1	3	6	5	Contribui pouco
I₈	Mínimo	11	1	1	0	0	Contribui
	Leve	2	1	3	0	0	Não contribui
	Moderado	3	2	2	2	1	Não contribui
	Grave	1	1	5	7	4	Contribui pouco
I₉	Mínimo	10	2	1	0	0	Contribui
	Leve	0	2	4	0	0	Não contribui
	Moderado	3	3	2	1	1	Não contribui
	Grave	3	0	4	7	4	Contribui pouco
I₁₀	Mínimo	11	1	1	0	0	Contribui
	Leve	3	1	0	2	0	Contribui pouco
	Moderado	0	2	5	3	0	Contribui pouco
	Grave	0	0	10	4	4	Não contribui
I₁₁	Mínimo	8	2	2	1	0	Contribui pouco
	Leve	3	1	1	1	0	Não contribui
	Moderado	1	1	4	3	1	Não contribui
	Grave	2	1	4	5	6	Contribui pouco
I₁₂	Mínimo	6	4	2	1	0	Não contribui
	Leve	1	2	1	2	0	Não contribui
	Moderado	5	0	1	1	3	Não contribui
	Grave	1	0	2	10	5	Contribui
I₁₃	Mínimo	3	3	5	2	0	Não contribui
	Leve	0	1	2	3	0	Não contribui
	Moderado	1	1	4	2	2	Contribui pouco
	Grave	0	0	3	6	9	Contribui
I₁₄	Mínimo	9	1	2	1	0	Contribui
	Leve	5	1	0	0	0	Contribui pouco
	Moderado	7	0	1	1	1	Não contribui
	Grave	11	3	1	2	1	Não contribui

Tabela 29:ASPI qualitativa restrita para avaliação do grau de contribuição de cada item do inventário Beck para identificação do nível de acometimento do transtorno de humor (HAM-D), com o inventário aplicado somente a pacientes com diagnóstico de transtorno de humor.

Inventário HAM-D	Nível de acometimento do constructo (HAM-D)	P0	P1	P2	P3	P4	ASPI qualitativa restrita
I₁	Mínimo	0	0	0	0	0	Não contribui
	Leve	6	8	0	1	0	Contribui
	Moderado	2	3	3	0	1	Não contribui
	Grave	1	3	2	11	15	Contribui
I₂	Mínimo	0	0	0	0	0	Não contribui
	Leve	13	1	1	0	0	Contribui
	Moderado	4	3	2	0	0	Não contribui
	Grave	8	2	12	9	1	Não contribui
I₃	Mínimo	0	0	0	0	0	Não contribui
	Leve	13	0	1	0	1	Contribui
	Moderado	8	0	1	0	0	Não contribui
	Grave	14	1	7	2	8	Não contribui
I₄	Mínimo	0	0	0	X	X	Não contribui
	Leve	11	3	1	X	X	Contribui
	Moderado	3	2	4	X	X	Não contribui
	Grave	9	3	20	X	X	Contribui
I₅	Mínimo	0	0	0	X	X	Não contribui
	Leve	9	2	4	X	X	Contribui pouco
	Moderado	2	0	7	X	X	Não contribui
	Grave	6	2	24	X	X	Contribui
I₆	Mínimo	0	0	0	X	X	Não contribui

	Leve	8	4	3	X	X	Contribui pouco
	Moderado	1	5	3	X	X	Não contribui
	Grave	3	13	6	X	X	Contribui
I₇	Mínimo	0	0	0	0	0	Não contribui
	Leve	7	4	0	3	1	Contribui pouco
	Moderado	1	2	2	2	2	Não contribui
	Grave	0	2	3	10	17	Contribui
I₈	Mínimo	0	0	0	0	0	Não contribui
	Leve	12	2	1	0	0	Contribui
	Moderado	5	1	3	0	0	Não contribui
	Grave	16	6	5	3	2	Contribui
I₉	Mínimo	0	0	0	0	0	Não contribui
	Leve	14	1	0	0	0	Contribui
	Moderado	6	2	0	1	0	Não contribui
	Grave	23	3	0	5	1	Contribui
I₁₀	Mínimo	0	0	0	0	0	Não contribui
	Leve	9	4	1	1	0	Contribui pouco
	Moderado	1	1	6	1	0	Não contribui
	Grave	2	2	0	13	15	Contribui
I₁₁	Mínimo	0	0	0	0	0	Não contribui
	Leve	4	7	4	0	0	Não contribui
	Moderado	1	2	5	1	0	Não contribui
	Grave	1	3	13	10	5	Contribui
I₁₂	Mínimo	0	0	0	X	X	Não contribui
	Leve	12	3	0	X	X	Contribui
	Moderado	6	3	0	X	X	Não contribui
	Grave	14	9	9	X	X	Não contribui
I₁₃	Mínimo	0	0	0	X	X	Não contribui
	Leve	5	5	5	X	X	Não contribui
	Moderado	0	6	3	X	X	Contribui pouco
	Grave	1	4	27	X	X	Contribui
I₁₄	Mínimo	0	0	0	X	X	Não contribui
	Leve	6	5	4	X	X	Não contribui
	Moderado	1	5	3	X	X	Não contribui
	Grave	3	6	23	X	X	Contribui
I₁₅	Mínimo	0	0	0	0	0	Não contribui
	Leve	8	1	5	1	0	Não contribui
	Moderado	2	0	5	2	0	Não contribui
	Grave	6	0	5	10	1	Não contribui
I₁₆	Mínimo	0	0	0	0	X	Não contribui
	Leve	14	0	1	0	X	Contribui
	Moderado	9	0	0	0	X	Contribui
	Grave	21	6	5	0	X	Contribui
I₁₇	Mínimo	0	0	0	X	X	Não contribui
	Leve	11	1	3	X	X	Contribui

	Moderado	8	0	1	X	X	Contribui
	Grave	26	5	1	X	X	Contribui
I₁₈	Mínimo	0	0	0	X	X	Não contribui
	Leve	7	4	4	X	X	Não contribui
	Moderado	5	2	1	X	X	Não contribui
	Grave	14	5	13	X	X	Não contribui
	Mínimo	0	0	0	0	0	Não contribui
I₁₉	Leve	13	1	0	0	1	Contribui
	Moderado	9	0	0	0	0	Contribui
	Grave	20	1	5	5	1	Contribuiu
	Mínimo	0	0	0	0	X	Não contribui
I₂₀	Leve	12	2	0	1	X	Contribui
	Moderado	5	2	0	2	X	Não contribui
	Grave	11	3	1	7	X	Não contribui
	Mínimo	0	0	0	X	X	Não contribui
I₂₁	Leve	10	3	2	X	X	Contribui pouco
	Moderado	4	2	3	X	X	Não contribui
	Grave	13	4	15	X	X	Não contribui

APÊNDICE 2

Tabela 30: ASPI qualitativa (restrita e ampla) e ASPI quantitativa para avaliação do grau de contribuição de cada item do inventário Beck para identificação do nível de acometimento do transtorno de humor (BDI), com o inventário aplicado a todos os 100 pacientes entrevistados, somente a pacientes com diagnóstico de transtorno de humor. Sendo: ASPI (Análise de Seleção de Parâmetros dos Itens); CA (coeficiente angular); CL (coeficiente linear); D (diferença entre coeficientes)

Inventário BDI	Nível de acometimento do constructo	P 0	P 1	P 2	P 3	ASPI qualitativa		ASPI quantitativa		
						Restrita	Ampla	CA	CL	D
I ₁	Mínimo	17	6	0	0	Contribui	Discerne o mínimo do grave	0,44	0,20	0,24
	Leve	9	13	2	0	Contribui				
	Moderado	7	13	6	7	Não contribui				
	Grave	0	5	5	8	Contribui pouco				
I ₂	Mínimo	21	2	0	0	Contribui	Discerne o mínimo do grave	0,36	0,22	0,14
	Leve	11	10	2	1	Contribui				
	Moderado	7	11	3	12	Não contribui				
	Grave	0	4	2	12	Contribui				
I ₃	Mínimo	21	2	0	0	Contribui	Discerne o mínimo do grave	0,41	0,23	0,18
	Leve	15	5	4	0	Contribui				
	Moderado	9	11	10	3	Não contribui				
	Grave	0	4	8	6	Contribui pouco				
I ₄	Mínimo	12	10	0	1	Contribui	Discerne o mínimo do grave	0,38	0,18	0,2
	Leve	5	15	1	3	Contribui				
	Moderado	2	18	4	9	Não contribui				
	Grave	0	1	3	14	Contribui				
I ₅	Mínimo	21	2	0	0	Contribui	Não discerne	0,31	0,27	0,04
	Leve	16	7	0	1	Contribui				
	Moderado	12	7	5	9	Não contribui				
	Grave	4	3	3	8	Contribui				
I ₆	Mínimo	22	1	0	0	Contribui	Não discerne	0,30	0,26	0,04
	Leve	18	5	0	1	Contribui				
	Moderado	12	6	2	13	Não contribui				
	Grave	3	2	3	10	Contribui				
I ₇	Mínimo	18	5	0	0	Contribui	Não discerne	0,44	0,28	0,16
	Leve	17	7	0	0	Contribui				
	Moderado	13	18	1	1	Contribui				
	Grave	5	6	4	3	Não contribui				
I ₈	Mínimo	10	11	2	0	Contribui	Não discerne	0,38	0,22	0,16
	Leve	5	13	5	1	Contribui pouco				
	Moderado	6	21	5	1	Contribui pouco				
	Grave	3	4	2	9	Contribui pouco				
I ₉	Mínimo	23	0	0	0	Contribui	Não discerne	0,41	0,29	0,12
	Leve	21	1	1	1	Contribui				
	Moderado	22	11	0	0	Contribui				
	Grave	4	4	1	9	Contribui pouco				
I ₁₀	Mínimo	21	1	0	1	Contribui	Não discerne	0,27	0,26	0,01
	Leve	11	5	2	6	Contribui pouco				
	Moderado	6	15	5	7	Contribui pouco				

	Grave	4	0	7	7	Não contribui				
I ₁₁	Mínimo	13	7	0	3	Contribui	Não discerne	0,28	0,24	0,04
	Leve	7	11	4	2	Contribui pouco				
	Moderado	4	13	7	9	Não contribui				
	Grave	0	5	10	3	Contribui pouco				
I ₁₂	Mínimo	17	5	1	0	Contribui	Não discerne	0,35	0,24	0,11
	Leve	9	9	3	3	Contribui				
	Moderado	9	12	9	3	Não contribui				
	Grave	2	1	8	7	Contribui				
I ₁₃	Mínimo	13	6	4	0	Contribui	Discerne um pouco entre todos	0,36	0,18	0,18
	Leve	5	7	10	2	Não contribui				
	Moderado	4	6	17	6	Contribui pouco				
	Grave	0	1	9	8	Contribui				
I ₁₄	Mínimo	20	3	0	0	Contribui	Discerne o mínimo do grave	0,38	0,22	0,16
	Leve	11	6	6	1	Contribui pouco				
	Moderado	6	12	10	5	Contribui pouco				
	Grave	2	2	6	8	Contribui				
I ₁₅	Mínimo	11	11	1	0	Contribui	Discerne moderado/grave do mínimo/leve	0,47	0,13	0,34
	Leve	3	12	9	0	Não contribui				
	Moderado	1	5	21	6	Contribui pouco				
	Grave	0	2	10	6	Contribui				
I ₁₆	Mínimo	11	10	1	1	Contribui	Discerne o mínimo do grave	0,33	0,20	0,13
	Leve	4	15	0	5	Contribui pouco				
	Moderado	3	15	6	9	Contribui pouco				
	Grave	1	2	3	12	Contribui				
I ₁₇	Mínimo	14	9	0	0	Contribui	Discerne um pouco entre todos	0,41	0,18	0,23
	Leve	5	11	8	0	Não contribui				
	Moderado	3	8	17	5	Contribui pouco				
	Grave	1	4	5	8	Contribui pouco				
I ₁₈	Mínimo	21	1	0	0	Contribui	Não discerne	0,40	0,27	0,13
	Leve	19	5	0	0	Contribui				
	Moderado	16	8	7	2	Não contribui				
	Grave	3	5	6	4	Não contribui				
I ₁₉	Mínimo	21	2	0	0	Contribui	Não discerne	0,55	0,33	0,22
	Leve	24	0	0	0	Contribui				
	Moderado	27	6	0	0	Não contribui				
	Grave	12	5	1	0	Não contribui				
I ₂₀	Mínimo	14	8	1	0	Contribui pouco	Não discerne	0,30	0,24	0,06
	Leve	12	5	6	1	Contribui pouco				
	Moderado	7	13	6	7	Não contribui				
	Grave	3	1	5	9	Contribui pouco				
I ₂₁	Mínimo	15	7	0	3	Contribui	Discerne o mínimo do grave	0,34	0,20	0,14
	Leve	5	11	3	5	Contribui pouco				
	Moderado	5	12	9	7	Não contribui				
	Grave	1	0	3	14	Contribui				

Tabela 31: ASPI qualitativa (restrita e ampla) e ASPI quantitativa para avaliação do grau de contribuição de cada item do inventário Beck para identificação do nível de acometimento do transtorno de ansiedade (BAI), com o inventário aplicado a todos os 100 pacientes entrevistados. somente a pacientes com diagnóstico de transtorno de humor. Sendo: ASPI (Análise de Seleção de Parâmetros dos Itens); CA (coeficiente angular); CL (coeficiente linear); D (diferença entre coeficientes)

Inventário BAI	Nível de acometimento do constructo	Opção 0	Opção 1	Opção 2	Opção 3	Análise qualitativa da distribuição do número de respondentes às opções de cada item	Coeficiente angular	Coeficiente linear	Diferença entre os coeficientes	
I ₁	Mínimo	19	3	0	0	Contribui	Não discerne	0,34	0,27	0,07
	Leve	14	7	2	0	Contribui pouco				
	Moderado	13	12	7	0	Não contribui				
	Grave	7	7	7	2	Não contribui				
I ₂	Mínimo	15	7	0	0	Contribui pouco	Não discerne	0,22	0,27	-0,05
	Leve	9	6	6	2	Não contribui				
	Moderado	8	9	13	2	Contribui pouco				
	Grave	5	6	10	2	Não contribui				
I ₃	Mínimo	19	2	1	0	Contribui	Não discerne	-0,01	0,35	-0,36
	Leve	18	3	2	0	Não contribui				
	Moderado	22	4	4	2	Não contribui				
	Grave	5	3	10	5	Não contribui				
I ₄	Mínimo	13	6	2	1	Contribui	Discerne um pouco entre todos	0,38	0,14	0,24
	Leve	3	11	7	2	Não contribui				
	Moderado	2	6	18	6	Contribui				
	Grave	0	2	9	12	Contribui				
I ₅	Mínimo	13	8	1	0	Contribui	Discerne o moderado/grave do mínimo/leve	0,32	0,18	0,14
	Leve	10	5	6	2	Contribui pouco				
	Moderado	2	8	9	13	Não contribui				
	Grave	2	1	8	12	Contribui				
I ₆	Mínimo	14	7	1	0	Contribui	Discerne grave e dos demais	0,41	0,21	0,20
	Leve	12	11	0	0	Contribui				
	Moderado	13	9	9	1	Não contribui				
	Grave	1	6	7	9	Não contribui				
I ₇	Mínimo	16	4	2	0	Contribui	Não discerne	0,32	0,22	0,10
	Leve	11	6	5	1	Contribui pouco				
	Moderado	10	7	12	3	Contribui pouco				
	Grave	2	2	13	6	Contribui				
I ₈	Mínimo	19	3	0	0	Contribui	Discerne grave e dos demais	0,43	0,22	0,21
	Leve	16	7	0	0	Contribui pouco				
	Moderado	15	6	10	1	Não contribui				
	Grave	1	7	8	7	Não contribui				
I ₉	Mínimo	21	1	0	0	Contribui	Não discerne	0,34	0,24	0,10
	Leve	18	4	1	0	Contribui pouco				
	Moderado	16	2	6	8	Não contribui				
	Grave	2	3	8	10	Contribui				
I ₁₀	Mínimo	8	9	5	0	Não contribui	Discerne o	0,40	0,12	

	Leve	2	13	6	2	Não contribui	<i>moderado/grave do mínimo/leve</i>			0,28
	Moderado	2	6	13	11	Não contribui				
	Grave	0	0	13	10	Contribui				
I ₁₁	Mínimo	21	1	0	0	Contribui	Não discerne	0,35	0,24	0,11
	Leve	17	4	1	1	Contribui pouco				
	Moderado	13	5	12	2	Não contribui				
I ₁₂	Grave	3	6	6	8	Não contribui	Não discerne	0,32	0,25	0,07
	Mínimo	19	2	1	0	Contribui				
	Leve	12	6	5	0	Contribui pouco				
I ₁₃	Moderado	13	10	6	3	Não contribui	Discerne <i>grave</i> e dos demais	0,39	0,22	0,18
	Grave	2	10	4	7	Não contribui				
	Mínimo	17	4	1	0	Contribui				
I ₁₄	Leve	13	5	5	0	Contribui pouco	Discerne um pouco o <i>moderado/grave</i> do <i>mínimo/leve</i>	0,34	0,18	0,16
	Moderado	9	13	8	2	Contribui pouco				
	Grave	0	9	9	5	Não contribui				
I ₁₅	Mínimo	14	7	1	0	Contribui	Não discerne	0,35	0,24	0,11
	Leve	10	6	5	2	Não contribui				
	Moderado	4	9	7	12	Não contribui				
I ₁₆	Grave	0	3	7	13	Contribui	Não discerne	0,26	0,27	-0,01
	Mínimo	17	4	1	0	Contribui				
	Leve	13	6	3	1	Contribui pouco				
I ₁₇	Moderado	16	9	7	0	Não contribui	Discerne <i>grave</i> e dos demais	0,37	0,22	0,23
	Grave	2	5	9	7	Não contribui				
	Mínimo	18	1	2	1	Contribui				
I ₁₈	Leve	17	3	3	0	Não contribui	Não discerne	0,31	0,24	0,07
	Moderado	15	7	4	6	Não contribui				
	Grave	5	6	3	9	Não contribui				
I ₁₉	Mínimo	16	6	0	0	Contribui	Discerne <i>grave</i> e dos demais	0,41	0,26	0,15
	Leve	12	9	2	0	Contribui				
	Moderado	11	12	6	3	Não contribui				
I ₂₀	Grave	3	1	8	11	Contribui	Não discerne	0,38	0,24	0,14
	Mínimo	21	1	0	0	Contribui				
	Leve	10	7	6	0	Não contribui				
I ₂₁	Moderado	12	8	8	4	Não contribui	Discerne <i>grave</i> e dos demais	0,41	0,26	0,15
	Grave	4	3	8	8	Não contribui				
	Mínimo	20	1	0	0	Contribui				
I ₂₀	Leve	15	6	2	0	Contribui pouco	Não discerne	0,31	0,23	0,08
	Moderado	22	5	3	2	Não contribui				
	Grave	6	4	5	8	Não contribui				
I ₂₀	Mínimo	22	0	0	0	Contribui	Não discerne	0,38	0,24	0,14
	Leve	17	3	3	0	Não contribui				
	Moderado	15	7	7	3	Não contribui				
I ₂₁	Grave	2	6	11	4	Contribui pouco	Não discerne	0,31	0,23	0,08
	Mínimo	16	5	1	0	Contribui				
	Leve	11	6	4	2	Não contribui				
	Moderado	11	8	10	3	Contribui pouco				

	Grave	3	4	7	9	Não contribui			
--	-------	---	---	---	---	---------------	--	--	--

Tabela 32: ASPI qualitativa (restrita e ampla) e ASPI quantitativa para avaliação do grau de contribuição de cada item do inventário Hamilton para identificação do nível de acometimento do transtorno de humor (HAM-D), com o inventário aplicado a todos os 100 pacientes entrevistados, somente a pacientes com diagnóstico de transtorno de humor. Sendo: ASPI (Análise de Seleção de Parâmetros dos Itens); CA (coeficiente angular); CL (coeficiente linear); D (diferença entre coeficientes)

Inventário HAM-D	Nível de acometimento do constructo	Opção 0	Opção 1	Opção 2	Opção 3	Opção 4	Análise qualitativa da distribuição do número de respondentes às opções de cada item	Coeficiente angular	Coeficiente linear	Diferença entre os coeficientes	
I ₁	Mínimo	3	0	0	0	0	Contribui	Discerne o mínimo do grave	0,36	0,20	0,16
	Leve	13	14	2	1	0	Contribui				
	Moderado	5	5	6	2	1	Não contribui				
	Grave	0	8	4	16	19	Contribui				
I ₂	Mínimo	2	1	0	0	0	Não contribui	Não discerne	0,36	0,26	0,1
	Leve	23	5	1	1	0	Contribui				
	Moderado	8	6	4	1	0	Não contribui				
	Grave	1	2	9	14	2	Contribui pouco				
I ₃	Mínimo	3	0	0	0	0	Contribui	Não discerne	0,30	0,30	0
	Leve	28	0	1	0	1	Contribui				
	Moderado	15	2	2	0	0	Não contribui				
	Grave	17	3	13	3	12	Contribui pouco				
I ₄	Mínimo	3	0	0	X	X	Contribui	Não discerne	0,19	0,28	- 0,09
	Leve	19	9	2	X	X	Contribui				
	Moderado	10	3	6	X	X	Não contribui				
	Grave	13	5	30	X	X	Contribui				
I ₅	Mínimo	2	0	1	X	X	Não contribui	Não discerne	0,18	0,26	-0,08
	Leve	19	2	9	X	X	Contribui				
	Moderado	6	0	13	X	X	Não contribui				
	Grave	8	6	34	X	X	Contribui				
I ₆	Mínimo	3	0	0	X	X	Não contribui	Não discerne	0,25	0,24	0,01
	Leve	16	10	4	X	X	Contribui				
	Moderado	4	14	4	X	X	Contribui				
	Grave	6	21	21	X	X	Contribui				
I ₇	Mínimo	2	0	0	0	1	Não contribui	Discerne o mínimo do grave	0,29	0,19	0,1
	Leve	11	6	3	5	5	Contribui pouco				
	Moderado	2	4	5	5	3	Não contribui				
	Grave	0	2	6	17	23	Contribui				
I ₈	Mínimo	3	0	0	0	0	Não contribui	Não discerne	0,34	0,32	0,02
	Leve	25	4	1	0	0	Contribui				
	Moderado	15	1	3	0	0	Não contribui				
	Grave	25	11	7	3	2	Não contribui				
I ₉	Mínimo	2	1	0	0	0	Não contribui	Não discerne	0,07	0,36	0,29
	Leve	28	1	1	0	0	Contribui				
	Moderado	12	4	0	3	0	Não contribui				
	Grave	37	4	1	5	1	Não contribui				

I ₁₀	Mínimo	3	0	0	0	0	Contribui	Discerne o mínimo do grave	0,34	0,18	0,16
	Leve	12	10	7	1	0	Contribui				
	Moderado	1	3	7	4	4	Não contribui				
	Grave	2	2	6	18	20	Contribui				
I ₁₁	Mínimo	2	1	0	0	0	Não contribui	Discerne grave e dos demais	0,43	0,17	0,26
	Leve	6	15	8	1	0	Contribui pouco				
	Moderado	2	6	9	2	0	Contribui				
	Grave	1	3	19	18	7	Contribui				
I ₁₂	Mínimo	3	0	0	X	X	Contribui	Não discerne	0,26	0,30	-0,04
	Leve	23	7	0	X	X	Contribui				
	Moderado	13	4	2	X	X	Não contribui				
	Grave	20	15	3	X	X	Não contribui				
I ₁₃	Mínimo	3	0	0	X	X	Contribui	Discerne o mínimo do grave	0,27	0,18	0,09
	Leve	13	8	9	X	X	Contribui				
	Moderado	2	7	10	X	X	Não Contribui				
	Grave	2	4	42	X	X	Contribui				
I ₁₄	Mínimo	3	0	0	X	X	Contribui	Não discerne	0,22	0,23	-0,01
	Leve	12	10	8	X	X	Não contribui				
	Moderado	5	6	8	X	X	Não contribui				
	Grave	4	9	35	X	X	Contribui				
I ₁₅	Mínimo	3	0	0	0	0	Contribui	Não discerne	0,32	0,23	0,1
	Leve	15	2	12	1	0	Não contribui				
	Moderado	4	0	10	5	0	Contribui pouco				
	Grave	6	0	11	30		Contribui				
I ₁₆	Mínimo	3	0	0	0	X	Contribui	Não discerne	0,33	0,34	-0,01
	Leve	27	1	2	0	X	Contribui				
	Moderado	17	2	0	0	X	Não contribui				
	Grave	34	6	8	0	X	Não contribui				
I ₁₇	Mínimo	3	0	0	X	X	Contribui	Não discerne	-0,05	0,38	-0,43
	Leve	26	1	3	X	X	Contribui				
	Moderado	17	1	1	X	X	Não contribui				
	Grave	42	5	1	X	X	Não contribui				
I ₁₈	Mínimo	3	0	0	X	X	Contribui	Não discerne	0,06	0,34	-0,28
	Leve	12	10	8	X	X	Não contribui				
	Moderado	8	7	4	X	X	Não contribui				
	Grave	17	7	24	X	X	Contribui pouco				
I ₁₉	Mínimo	3	0	0	0	0	Contribui	Não discerne	0,19	0,35	-0,16
	Leve	26	2	1	0	1	Contribui				
	Moderado	18	1	0	0	0	Não contribui				
	Grave	34	2	5	8	1	Não contribui				
I ₂₀	Mínimo	2	1	0	0	X	Não contribui	Não discerne	0,21	0,28	-0,07
	Leve	21	6	0	3	X	Contribui				
	Moderado	8	6	2	3	X	Não contribui				
	Grave	14	6	2	26	X	Contribui pouco				
I ₂₁	Mínimo	2	0	1	X	X	Não contribui	Não	0,13	0,32	

	Leve	22	4	4	X	X	Contribui	discerne			0,32
	Moderado	10	4	5	X	X	Não contribui				
	Grave	8	7	23	X	X	Contribui				

Tabela 33:ASPI qualitativa (restrita e ampla) e ASPI quantitativa para avaliação do grau de contribuição de cada item do inventário Hamilton para identificação do nível de acometimento do transtorno de ansiedade (HAM-A), com o inventário aplicado a todos os 100 pacientes entrevistados. somente a pacientes com diagnóstico de transtorno de humor. Sendo: ASPI (Análise de Seleção de Parâmetros dos Itens); CA (coeficiente angular); CL (coeficiente linear); D (diferença entre coeficientes)

Inventário HAM-A	Nível de acometimento do constructo	Opção 0	Opção 1	Opção 2	Opção 3	Opção 4	Análise qualitativa da distribuição do número de respondentes às opções de cada item	Coeficiente angular	Coeficiente linear	Diferença entre os coeficientes	CTI	ACRI	
I ₁	Mínimo	9	8	8	1	0	Não contribui	Discerne grave e dos demais	0,49	0,21	0,28	0,65	0,86
	Leve	1	7	5	4	0	Não contribui						
	Moderado	3	13	0	3	2	Não contribui						
	Grave	1	1	3	19	12	Contribui						
I ₂	Mínimo	11	5	7	2	1	Não contribui	Discerne grave e dos demais	0,52	0,18	0,34	0,72	0,86
	Leve	2	4	7	4	0	Não contribui						
	Moderado	2	0	10	7	2	Contribui						
	Grave	0	1	4	20	11	Contribui						
I ₃	Mínimo	17	3	5	0	1	Contribui	Não discerne	0,32	0,35	-0,03	0,47	0,87
	Leve	9	5	1	1	1	Contribui						
	Moderado	7	2	5	5	2	Não contribui						
	Grave	7	2	5	12	10	Contribui						
I ₄	Mínimo	15	1	4	2	4	Não contribui	Não discerne	0,32	0,27	0,05	0,49	0,87
	Leve	3	2	4	3	4	Não contribui						
	Moderado	3	0	4	4	10	Não contribui						
	Grave	2	0	0	11	23	Contribui						
I ₅	Mínimo	8	5	5	6	2	Não contribui	Não discerne	0,35	0,26	0,09	0,47	0,87
	Leve	2	2	5	5	3	Não contribui						
	Moderado	4	4	3	4	6	Não contribui						
	Grave	0	2	6	12	16	Contribui						
I ₆	Mínimo	7	5	10	2	2	Não contribui	Discerne grave e dos demais	0,44	0,20	0,24	0,61	0,86
	Leve	3	0	11	3	0	Não contribui						
	Moderado	0	2	8	4	7	Não contribui						
	Grave	2	1	1	12	19	Contribui						
I ₇	Mínimo	20	1	3	1	1	Contribui	Não discerne	0,36	0,33	0,03	0,57	0,87
	Leve	6	6	0	4	1	Contribui pouco						
	Moderado	8	1	6	4	1	Não contribui						
	Grave	6	3	6	13	8	Contribui						
I ₈	Mínimo	19	3	2	2	0	Contribui	Não discerne	0,44	0,29	0,15	0,65	0,86
	Leve	6	4	6	1	0	Não contribui						
	Moderado	5	4	8	3	1	Não contribui						

	Grave	4	2	7	16	7	Contribui pouco						
I ₉	Mínimo	19	4	1	1	1	Contribui	Não discerne	0,37	0,31	0,06	0,55	0,87
	Leve	2	4	6	3	2	Não contribui						
	Moderado	5	3	7	5	1	Não contribui						
	Grave	5	2	6	14	9	Contribui pouco						
I ₁₀	Mínimo	22	2	1	0	1	Contribui	Não discerne	0,47	0,27	0,20	0,72	0,86
	Leve	7	3	4	3	0	Não contribui						
	Moderado	3	3	9	6	0	Contribui pouco						
	Grave	1	2	12	10	11	Contribui pouco						
I ₁₁	Mínimo	18	3	3	2	0	Contribui	Não discerne	0,37	0,31	0,06	0,56	0,87
	Leve	7	4	3	3	0	Contribui pouco						
	Moderado	4	3	4	9	1	Contribui pouco						
	Grave	5	1	8	8	14	Contribui						
I ₁₂	Mínimo	13	8	3	1	1	Contribui	Não discerne	0,35	0,30	0,05	0,53	0,87
	Leve	5	6	3	2	1	Contribui pouco						
	Moderado	6	1	4	2	8	Não contribui						
	Grave	3	1	8	14	10	Contribui						
I ₁₃	Mínimo	8	5	9	4	0	Não contribui	Discerne <i>grave</i> e dos demais	0,47	0,20	0,27	0,60	0,87
	Leve	0	1	7	9	0	Não contribui						
	Moderado	3	2	10	4	2	Não contribui						
	Grave	1	1	7	11	16	Contribui						
I ₁₄	Mínimo	22	1	2	1	0	Contribui	Não discerne	0,12	0,45	-0,34	0,06	0,89
	Leve	11	4	2	0	0	Contribui						
	Moderado	14	0	4	2	1	Contribui						
	Grave	24	3	4	3	2	Não contribui						

ANEXOS

Escala de Hamilton - Depressão

Todos os itens devem ser preenchidos. Assinalar o número apropriado.

1. HUMOR DEPRIMIDO (Tristeza, desesperança, desamparo, inutilidade)

0. Ausente.

1. Sentimentos relatados apenas ao ser inquirido.

2. Sentimentos relatados espontaneamente com palavras.

3. Comunica os sentimentos não com palavras, isto é, com a expressão facial, a postura, a voz e a tendência ao choro.

4. Sentimentos deduzidos da comunicação verbal e não-verbal do paciente.

2. SENTIMENTOS DE CULPA

0. Ausente

1. Auto-recriminação; sente que decepcionou os outros.

2. Idéias de culpa ou ruminação sobre erros passados ou más ações.

3. A doença atual é um castigo.

4. Ouve vozes de acusação ou denúncia e/ou tem alucinações visuais ameaçadoras.

3. SUICÍDIO

0. Ausente.

1. Sente que a vida não vale a pena.

2. Desejaria estar morto ou pensa na probabilidade de sua própria morte.

3. Idéias ou gestos suicidas.

4. Tentativa de suicídio (qualquer tentativa séria, marcar 4).

4. INSÔNIA INICIAL

0. Sem dificuldades para conciliar o sono.

1. Queixa-se de dificuldade ocasional para conciliar o sono, isto é, mais de meia hora.

2. Queixa-se de dificuldade para conciliar o sono todas as noites.

5. INSÔNIA INTERMEDIÁRIA

0. Sem dificuldades.

1. O paciente se queixa de inquietude e perturbação durante a noite.

2. Acorda à noite - qualquer saída da cama marcar 2(exceto p/ urinar).

6. INSÔNIA TARDIA

0. Sem dificuldades.

1. Acorda de madrugada, mas volta a dormir

2. Incapaz de voltar a conciliar o sono se deixar a cama.

7. TRABALHO E ATIVIDADES

0. Sem dificuldades.

1. Pensamento e sentimentos de incapacidade, fadiga ou fraqueza relacionada a atividades, trabalho ou passatempos.

2. Perda de interesse por atividades (passatempos ou trabalho) quer diretamente relatada pelo paciente, quer indiretamente por desatenção, indecisão e vacilação (sente que precisa esforçar-se para o trabalho ou atividade).

3. Diminuição do tempo gasto em atividades ou queda de produtividade. No hospital, marcar 3 se o paciente não passar ao menos 3 horas por dia em atividades externas (trabalho hospitalar ou passatempo).

4. Parou de trabalhar devido à doença atual. No hospital, marcar 4 se o paciente não se ocupar com outras atividades, além de pequenas tarefas do leito, ou for incapaz de realizá-las sem ajuda.

8. RETARDO (lentidão de idéias e fala; dificuldade de concentração; atividade motora diminuída)

0. Pensamento e fala normais.

1. Leve retardo à entrevista.

2. Retardo óbvio à entrevista.

3. Entrevista difícil.

4. Estupor completo.

9. AGITAÇÃO

0. Nenhuma.

1. Inquietude.

2. Brinca com as mãos, com os cabelos, etc.

3. Mexe-se, não consegue sentar quieto.

4. Torce as mãos, rói as unhas, puxa os cabelos, morde os lábios.

10. ANSIEDADE PSÍQUICA

0. Sem dificuldade.

1. Tensão e irritabilidade subjetivas.

2. Preocupação com trivialidades.

3. Atitude apreensiva aparente no rosto ou na fala.

4. Medos expressos sem serem inquiridos.

11. ANSIEDADE SOMÁTICA

Concomitantes fisiológicos de ansiedade, tais como:

Gastrointestinais: boca seca, flatulência, indigestão, diarreia, cólicas, eructação;

Cardiovasculares: palpitações, cefaléia;

Respiratórios: hiperventilação, suspiros; Freqüência urinária; Sudorese

0. Ausente :

1. Leve

2. Moderada

3. Grave

4. Incapacitante

12. SINTOMAS SOMÁTICOS GASTRINTESTINAIS

0. Nenhum

1. Perda de apetite, mas alimenta-se voluntariamente. Sensações de peso no abdomen

2. Dificuldade de comer se não insistirem. Solicita ou exige laxativos ou medicações para os intestinos ou para sintomas digestivos.

13. SINTOMAS SOMÁTICOS EM GERAL

0. Nenhum

1. Peso nos membros, nas costas ou na cabeça. Dores nas costas, cefaléia, mialgias.

Perda de energia e cansaço.

2. Qualquer sintoma bem caracterizado e nítido, marcar 2.

14. SINTOMAS GENITAIS

Sintomas como: perda da libido, distúrbios menstruais

0. Ausentes

1. Leves

2. Intensos

15. HIPOCONDRIA

0. Ausente

1. Auto-observação aumentada (com relação ao corpo)

2. Preocupação com a saúde

3. Queixas freqüentes, pedidos de ajuda, etc.

4. Idéias delirantes hipocondríacas.

16. PERDA DE PESO (Marcar A ou B)

A - Quando avaliada pela história clínica

0. Sem perda de peso.

1. Provável perda de peso associada à moléstia atual.

2. Perda de peso definida (de acordo com o paciente)

3. Não avaliada.

B - Avaliada semanalmente pelo psiquiatra responsável, quando são medidas alterações reais de peso

0. Menos de 0,5 Kg de perda por semana.

1. Mais de 0,5 Kg de perda por semana.

2. Mais de 1 Kg de perda por semana.

3. Não avaliada.

17. CONSCIÊNCIA

0. Reconhece que está deprimido e doente.

1. Reconhece a doença mas atribui-lhe a causa à má alimentação, ao clima, ao excesso de trabalho, a vírus, à necessidade de repouso, etc.

2. Nega estar doente.

18. VARIAÇÃO DIURNA

A - Observar se os sintomas são piores pela manhã ou à tarde. Caso NÃO haja variação, marcar "nenhuma".

0. Nenhuma

1. Pior de manhã.
2. Pior à tarde.

B - Quando presente, marcar a gravidade da variação. Marcar "nenhuma" caso NÃO haja variação.

0. Nenhuma.
1. Leve
2. Grave

NOTA: Caso haja variação diurna, só a contagem referente à sua gravidade (1 ou 2 pontos no item 18B) é que deve ser incluída na contagem final. O item 18 A não deve ser computado.

19. DESPERSONALIZAÇÃO E PERDA DE NOÇÃO DE REALIDADE

Tais como: sensações de irrealidade, idéias niilistas

0. Ausente
1. Leve.
2. Moderadas.
3. Graves.
4. Incapacitantes.

20. SINTOMAS PARANÓIDES

0. Nenhum.
1. Desconfiança.
2. Idéias de referência.
3. Delírio de referência e perseguição.

21. SINTOMAS OBSESSIVOS E COMPULSIVOS

0. Nenhum.
1. Leves.
2. Graves.

Escala de Hamilton -
Ansiedade

Escores:	0= Ausência;	1= intensidade ligeira;	2= intensidade média;	3= intensidade forte;	4= intensidade máxima (incapacitante)
HUMOR ANSIOSO-inquietude, temor do pior, apreensão quanto ao futuro ou presente, irritabilidade:	0	1	2	3	4
TENSÃO - sensação de tensão, fadigabilidade, tremores, choro fácil, incapacidade de relaxar, agitação, reações de sobressalto:	0	1	2	3	4
MEDO - de escuro, de desconhecidos, de multidão, de ser abandonado, de animais grandes, de trânsito :	0	1	2	3	4
INSÔNIA - dificuldade de adormecer, sonhos penosos, sono interrompido, sono insatisfatório, fadiga ao acordar, pesadelos, terrores noturnos:	0	1	2	3	4
DIFICULDADES INTELECTUAIS - dificuldade de concentração, distúrbios de memória;	0	1	2	3	4
HUMOR DEPRESSIVO - perda de interesse, humor variável, indiferença às atividades de rotina, despertar precoce, depressão;	0	1	2	3	4
SINTOMAS SOMÁTICOS GERAIS (MUSCULARES) - dores e lassidão muscular, rigidez muscular, mioclonias, ranger de dentes, voz insegura:	0	1	2	3	4
SINTOMAS SOMÁTICOS GERAIS (SENSORIAIS) - visão turva, ondas de calor ou frio, sensação de fraqueza, sensação de picada, zumbidos:	0	1	2	3	4
SINTOMAS CARDIOVASCULARES - taquicardia, palpitações, dores pré-cordiais, batidas, pulsações arteriais, sensação de desmaio:	0	1	2	3	4
SINTOMAS RESPIRATÓRIOS -sensação de opressão, dispnéia, constrição torácica, suspiro, bolo faríngeo:	0	1	2	3	4
SINTOMAS GASTROINTESTINAIS - dificuldade de engolir, aerofagia, dispepsia, dor pré ou pós-prandial, queimações, empanzimento, náuseas, vômitos, cólicas diarreias, constipação, perda de peso:	0	1	2	3	4
SINTOMAS GÊNITO-URINÁRIOS - micções freqüentes, urgência de micção, frigidez amenorréia, ejaculação precoce, ausência de ereção, impotência:	0	1	2	3	4
SINTOMAS DO SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO - secura na boca, ruborização, palidez, tendência à sudação, vertigens, cefaléia de tensão:	0	1	2	3	4
COMPORTAMENTO NA ENTREVISTA - <u>Geral</u> : tenso, pouco à vontade, agitação das mãos, dos dedos tiques, inquietação, respiração suspirosa. <u>Fisiológico</u> : eructações, taquicardia em repouso, ritmo respiratório > 20 rpm:	0	1	2	3	4
TOTAL :					

INVENTÁRIO BECK DE DEPRESSÃO (BDI)

Nome: _____ data: ___ / ___ / ___

Neste questionário estão grupos de afirmações. Por favor, leia cada grupo de afirmações com cuidado. Então escolha a única afirmação em cada grupo que melhor descreve o modo como você esteve se sentindo na SEMANA PASSADA, INCLUSIVE HOJE! Circule o número do lado da afirmação que você escolheu. Se várias afirmações no grupo parecem aplicar-se igualmente bem. CERTIFIQUE-SE LER TODAS AS AFIRMATIVAS EM CADA GRUPO ANTES DE FAZER A SUA ESCOLHA.

- 1) 0 Eu não me sinto triste.
 - 1 Eu me sinto triste.
 - 2 Eu me sinto triste o tempo todo e não consigo sair disso.
 - 3 Eu estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar.

- 2) 0 Eu não estou particularmente desencorajado em relação ao futuro.
 - 1 Eu me sinto desencorajado em relação ao futuro.
 - 2 Eu sinto que não tenho nada porque esperar.
 - 3 Eu sinto que o futuro não tem esperanças e que as coisas não podem melhorar.

- 3) 0 Eu não me sinto um fracasso.
 - 1 Eu sinto que falhei mais do que a média das pessoas.
 - 2 Quando olho para trás em minha vida, tudo o que consigo ver é um monte de fracassos.
 - 3 Eu sinto que sou um fracasso completo como pessoa.

- 4) 0 Eu obtenho tanta satisfação com as coisas como costumava ter.
 - 1 Eu não gosto das coisas do modo como costumava gostar.
 - 2 Eu não obtenho satisfação real de mais nada.
 - 3 Eu estou insatisfeito ou entediado com tudo.

- 5) 0 Eu não me sinto particularmente culpado
 - 1 Eu me sinto culpado durante uma boa parte do tempo
 - 2 Eu me sinto bastante culpado durante a maior parte do tempo.
 - 3 Eu me sinto culpado o tempo todo.

- 6) 0 Eu não sinto que estou sendo punido.
 - 1 Eu sinto que posso ser punido
 - 2 Eu espero ser punido

- 3 Eu sinto que estou sendo punido
- 7) 0 Eu não me sinto decepcionado comigo.
1 Eu estou decepcionado comigo
2 Eu estou aborrecido comigo
3 Eu me odeio.
- 8) 0 Eu não sinto que seja pior do que qualquer outra pessoa.
1 Eu me critico pelas minhas fraquezas ou erros.
2 Eu me incrimino o tempo todo pelas minhas falhas.
3 Eu me incrimino por tudo de ruim que acontece.
- 9) 0 Eu não tenho nenhum pensamento de me matar.
1 Eu tenho pensamentos de me matar, mas não os colocaria em prática
2 Eu gostaria de me matar
3 Eu me mataria se tivesse uma oportunidade.
- 10) 0 Eu não choro mais do que o habitual
1 Eu choro mais agora do que costumava chorar
2 Eu gostaria de me matar
3 Eu costumava ser capaz de chorar, mas agora não consigo chorar mesmo que queira.
- 11) 0 Eu não estou mais irritado agora do que sempre estou.
1 Eu fico aborrecido ou irritado mais facilmente do que costumava ficar.
2 Eu me sinto irritado o tempo inteiro agora.
3 Eu não fico nem um pouco irritado por coisas que costumavam me irritar.
- 12) 0 Eu não perdi o interesse pelas outras pessoas
1 Eu estou menos interessado nas outras pessoas do que costumava estar.
2 Eu perdi a maior parte do meu interesse pelas outras pessoas.
3 Eu perdi todo o meu interesse pelas outras pessoas.
- 13) 0 Eu tomo decisões mais ou menos tão bem quanto eu sempre consegui.
1 Eu adio tomar decisões mais do que costumava adiar.
2 Eu tenho maior dificuldade para tomar decisões do que antes.
3 Eu não consigo mais tomar decisão alguma
- 14) 0 Eu não sinto que me aparência esteja pior do que era
1 Eu estou preocupado que esteja parecendo velho ou não atraente.

- 2 Eu sinto que há mudanças permanentes na minha aparência que me fazem parecer não atraente.
- 3 Eu não consigo mais tomar decisão alguma
- 15) 0 Eu consigo trabalhar aproximadamente tão bem quanto antes.
- 1 É necessário um esforço extra para começar qualquer coisa
- 2 Eu tenho que me forçar muito para fazer qualquer coisa
- 3 Eu não consigo mais fazer trabalho algum
- 16) 0 Eu consigo dormir tão bem quanto o habitual
- 1 Eu não durmo tão bem quanto costumava dormir
- 2 Eu acordo 1 a 2 horas mais cedo do que o habitual e acho difícil voltar a dormir
- 3 Eu acordo várias horas mais cedo do que costumava e não consigo voltar a dormir
- 17) 0 Eu não fico mais cansado que o habitual.
- 1 Eu fico cansado mais facilmente do que costumava ficar.
- 2 Eu fico cansado ao fazer quase qualquer coisa.
3. Eu estou cansado demais para fazer qualquer coisa
- 18) 0 Meu apetite não está pior do que o habitual.
- 1 Meu apetite não está tão bom quanto costumava ser.
- 2 Meu apetite está muito pior agora
3. Não tenho mais nenhum apetite.
- 19) 0 Eu perdi pouco ou nenhum peso ultimamente.
- 1 Eu perdi mais de 2,5Kg. 2 Eu perdi mais de 5,0Kg
- 3 Eu perdi mais de 7,5Kg.
- 20) 0 Eu não estou mais preocupado sobre a minha saúde do que o habitual
- 1 Eu estou preocupado com problemas físicos como mal-estares e dores; ou desconforto estomacal; ou constipação
- 2 Eu estou muito preocupado com meus problemas físicos e é difícil pensar em outras coisas.
3. Eu estou tão preocupado com meus problemas físicos que não consigo pensar em mais nada.
- 21) 0 Eu não percebi nenhuma mudança recente no meu interesse por sexo.
- 1 Eu estou menos interessado em sexo do que costumava estar.
- 2 Eu estou muito menos interessado em sexo agora.
- 3 Eu perdi completamente o interesse por sexo.

INVENTÁRIO BECK DE ANSIEDADE (BAI)

Nome: _____ Data: ____/____/____

Abaixo, está uma lista de sintomas comuns de ansiedade. Por favor, leia cuidadosamente cada item da lista. Indique **quanto** você foi incomodado, por cada um dos sintomas listados à esquerda, durante a **última semana, inclusive hoje**, marcando um X no grau de incômodo correspondente a uma das caselas das colunas à direita.

Nº	Sintomas	Quanto foi incomodado			
		Nada 0	Fraco 1	Moderadamente 2	Muito forte 3
		Não incomodou nada	Incomodou-me um pouco	Foi muito desagradável, mas consegui aguentar	Quase não consegui aguentar
1	Dormência ou formigamento				
2	Calores				
3	Pernas bambas				
4	Incapaz de relaxar				
5	Medo do pior acontecer				
6	Tonteira ou cabeça leve				
7	Coração batendo forte ou acelerado				
8	Inquieto(a)				
9	Aterrorizado(a)				
10	Nervoso(a)				
11	Sensação de sufocamento				
12	Mãos tremendo				
13	Trêmulo(a)				
14	Medo de perder o controle				
15	Dificuldade de respirar				
16	Medo de morrer				
17	Assustado(a)				
18	Indigestão ou desconforto no abdômen				
19	Desmaio				
20	Face ruborizada				
21	Suores (não devido a calor)				
ESCORE:					